

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Афлубин®
Aflubin®

Регистрационный номер: П N013116/01

Торговое название препарата: Афлубин® / Aflubin®

Лекарственная форма: капли гомеопатические

Состав

В 100 мл препарата содержится:

активные компоненты: Gentiana (Генциана) D1 1 мл, Aconitum (Аконитум) D6 10 мл, Bryonia (Бриония) D6 10 мл, Ferrum phosphoricum (Феррум фосфорикум) D12 10 мл, Acidum sarcolacticum (Ацидум сарколактикум) D12 10 мл;

вспомогательные компоненты: спирт этиловый (этанол) 43 % (по массе) 59 мл.

Описание

Прозрачная от бесцветной до бесцветной со слегка желтоватым оттенком жидкость без специфического запаха.

Фармакотерапевтическая группа: гомеопатическое лекарственное средство.

Показания к применению

В комплексном лечении гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний с целью облегчения симптомов указанных заболеваний, а также для их профилактики как плановой, так и экстренной; при лечении

воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

Детский возраст до 1 года.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Для обеспечения наибольшей эффективности Афлубин® следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи.

| Возраст | Доза (разовая) | Кратность приема | Способ применения |
|---|-------------------|---------------------------------|---|
| 1 - 2 день заболевания ОРЗ или гриппом | | | |
| Взрослые и подростки | 10 капель | От 3 до 8 раз в день (не более) | Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. |
| Дети от 1 года до 12 лет | 5 капель | | |
| Дальнейшее лечение клинических проявлений ОРЗ или гриппа | | | |
| Взрослые и подростки | 10 капель | 3 раза в день. 5-10 | Внутрь в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или |

| | | | |
|--|-----------|---|---|
| Дети от 1 года до 12 лет | 5 капель | дней | через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. |
| Плановая профилактика обострения заболевания в начале холодного времени года или перед эпидемией гриппа | | | |
| Взрослые и подростки | 10 капель | 2 раза в день. | Внутри в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. |
| Дети от 1 года до 12 лет | 5 капель | 3 недели | |
| Экстренная профилактика – проводится сразу же после контакта с заболевшим гриппом или ОРЗ или после сильного переохлаждения | | | |
| Взрослые и подростки | 10 капель | 2 раза в день. | Внутри в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. |
| Дети от 1 года до 12 лет | 5 капель | 2 дня | |
| Лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом | | | |
| Взрослые и подростки | 10 капель | 3-8 раз в день в начале лечения (1-2 день), дальнейшее лечение 3 раза в день в течение 1 месяца | Внутри в чистом виде или развести в столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. |
| Дети от 1 года до 12 лет | 5 капель | | |

В начале заболевания, а также случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата по 8-10 капель каждые полчаса – час до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Редко может отмечаться повышенное слюноотделение. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат не должен применяться пациентами с алкогольной зависимостью. Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Поскольку препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Влияние на способность управлять механизмами и автомобилем: в период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

В состав препарата входит спирт этиловый (этанол) - 43% по массе. Афлубин® (Aflubin®) - капли содержит в разовой дозе (10 капель) 0,17 спирта этилового (этанола). В максимальной суточной дозе (8 раз в день по 10 капель) содержится 1,35 г этилового спирта (этанола).

Форма выпуска

Капли гомеопатические.

По 20 или 50 мл во флаконы из коричневого стекла (тип III) с навинчивающейся крышкой из пропилена с контролем первого вскрытия, с капельницей из полиэтилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

В оригинальной упаковке и защищенном от сильных электромагнитных полей месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Рихард Биттнер АГ

Юридический адрес: Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия

Адрес места производства: Оссиахерштрассе 7, А-9560 Фельдкирхен, Австрия.

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Биттнер Фарма»

127018, Москва, ул. Суцьевский вал, д. 18,

тел.: +7 (495)981-48-88, факс: +7 (495)981-48-01