

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АФЛУБИН® (AFLUBIN®)

Комплексный гомеопатический препарат

Регистрационный номер: № ЛС-000470

Торговое название препарата: Афлубин®/ Aflubin®.

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические

Состав:

В 1-й таблетке (250 мг) содержится:

Активные вещества: Горечавка (Gentiana) D1- 3,6 мг, Аконит (Aconitum) D6- 37,2 мг, Бриония (Bryonia) D6- 37,2 мг, Железа фосфат (Ferrum phosphoricum) D12- 37,2 мг, Кислота молочная (Acidum sarcolacticum) D12- 37,2 мг.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

Описание: круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, белого цвета, без запаха.

Показания к применению: в комплексном лечении гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний с целью облегчения симптомов указанных заболеваний, а также для их профилактики как плановой, так и экстренной. Для лечения воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период лактации: при беременности и в период лактации препарат применяется по назначению врача.

Способ применения и дозы:

Для обеспечения наибольшей эффективности АФЛУБИН® следует принимать за 30 минут до или через 1 час после приема пищи, таблетку держать под языком до полного рассасывания.

Возраст	Доза (разовая)	Кратность приема	Способ применения
1 - 2 день заболевания ОРЗ или гриппом			
Взрослые и подростки	1 таблетка	От 3 до 8 раз в день (не более)	за 30 минут до или через 1 час после еды
Дети до 12 лет	½ таблетки	От 3 до 8 раз в день (не более)	за 30 минут до или через 1 час после еды
Дети до 1 года	½ таблетки	От 3 до 8 раз в день (не более)	развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока, давать по 1 капле за 30 минут до или через 1 час после кормления
Дальнейшее лечение клинических проявлений ОРЗ или гриппа			
Взрослые и подростки	1 таблетка	3 раза в день. 5-10 дней	за 30 минут до или через 1 час после еды
Дети до 12 лет	½ таблетки	3 раза в день. 5-10 дней	за 30 минут до или через 1 час после еды
Дети до 1 года	½ таблетки	3 раза в день. 5-10 дней	развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока, давать по 1 капле за 30 минут до или через 1 час после кормления
Плановая профилактика обострения заболевания в начале холодного времени года или перед эпидемией гриппа			
Взрослые и подростки	1 таблетка	2 раза в день. 3 недели	за 30 минут до или через 1 час после еды
Дети до 12 лет	½ таблетки	2 раза в день. 3 недели	за 30 минут до или через 1 час после еды
Дети до 1 года	½ таблетки	2 раза в день. 3 недели	развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока, давать по 1 капле за 30 минут до или через 1 час после кормления
Экстренная профилактика – проводится сразу же после контакта с заболевшим гриппом или ОРЗ или после сильного переохлаждения			
Взрослые и подростки	1 таблетка	2 раза в день. 2 дня	за 30 минут до или через 1 час после еды.
Дети до 12 лет	½ таблетки	2 раза в день. 2 дня	за 30 минут до или через 1 час после еды
Дети до 1 года	½ таблетки	2 раза в день. 2 дня	развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока, давать по 1 капле за 30 минут до или через 1 час после кормления
Лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом			
Взрослые и подростки	1 таблетка	3-8 раз в день в начале лечения (1-2 дня), дальнейшее лечение 3 раза в день в течение 1 месяца	за 30 минут до или через 1 час после еды
Дети до 12 лет	½ таблетки	3-8 раз в день в начале лечения (1-2 дня), дальнейшее лечение 3 раза в день в течение 1 месяца	за 30 минут до или через 1 час после еды

Побочное действие: на настоящий момент возникновения побочных эффектов не зарегистрировано.

Передозировка: случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

Форма выпуска: по 12 таблеток в блистере из алюминиевой фольги и ПВХ/ПВДХ. По 1, 2, 3 или 4 блистера помещают вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонную пачку.

Условия хранения: при температуре не выше 25° С в защищенном от света месте.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок хранения: 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель:

«Рихард Биттнер АГ», Райснерштрассе 55-57, А-1030, Вена, Австрия.

Московское Представительство «Хербс Трейдинг ГмбХ»:

123242, Москва, Новинский бульвар д.31, телефон 981-48-88, факс 981-48-01